

ANTIBIÓTICOS CON FLUOROQUINOLONAS: MAYOR RIESGO DE ROTURAS O DESGARROS EN LA AORTA, ARTERIA PRINCIPAL DEL CUERPO, EN CIERTOS PACIENTES

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV), comunica a los profesionales de salud, instituciones, establecimientos farmacéuticos y al público en general que la FDA está reforzando las advertencias sobre la información de prescripción de los antibióticos con fluoroquinolonas ya que **PODRÍAN CAUSAR MAYOR RIESGO DE ROTURAS O DESGARROS EN LA AORTA, ARTERIA PRINCIPAL DEL CUERPO, EN CIERTOS PACIENTES.**

La revisión de la FDA encontró que los antibióticos con fluoroquinolonas pueden aumentar la aparición de eventos raros pero graves de roturas o desgarros en la arteria principal del cuerpo, la aorta. Estos desgarros, llamados disecciones aórticas o rupturas de un aneurisma aórtico, pueden provocar sangrado peligroso o incluso la muerte. Pueden ocurrir con fluoroquinolonas para uso sistémico administrado por vía oral o por inyección.

Los antibióticos con fluoroquinolonas están aprobados para tratar ciertas infecciones bacterianas y se han usado por más de 30 años. Funcionan eliminando o deteniendo el crecimiento de bacterias que pueden causar enfermedades. Sin tratamiento, algunas infecciones pueden propagarse y provocar problemas de salud graves.

En ese sentido, se recomienda a los profesionales de la salud tener en cuenta que:

- Evite recetar antibióticos con fluoroquinolonas a los pacientes que tienen un aneurisma aórtico o que están en riesgo de sufrir un aneurisma aórtico, como los pacientes con enfermedades vasculares relacionadas con aterosclerosis periférica, hipertensión, ciertas afecciones genéticas como el síndrome de Marfan y el síndrome de Ehlers-Danlos, y pacientes de edad avanzada.
- Prescriba fluoroquinolonas a estos pacientes solo cuando no haya otras opciones de tratamiento disponibles.
- Aconseje a todos los pacientes que busquen tratamiento médico inmediato para cualquier síntoma asociado con un aneurisma aórtico.
- Detenga el tratamiento con fluoroquinolonas inmediatamente si un paciente informa efectos secundarios que sugieran un aneurisma o disección aórtica.

Se recomienda a los pacientes:

- Buscar atención médica de inmediato yendo a una sala de emergencias o llamando al 911 si experimenta dolor repentino, intenso y constante en el estómago, el tórax o la espalda.

- Tener en cuenta que los síntomas de un aneurisma aórtico a menudo no aparecen hasta que el aneurisma se vuelve grande o estalla, por lo que debe informar de inmediato a su profesional de la salud cualquier efecto secundario inusual al tomar fluoroquinolonas.
- Informar a su profesional de la salud antes de comenzar una prescripción de antibióticos, si tiene antecedentes de aneurismas, obstrucciones o endurecimiento de las arterias, presión arterial alta o afecciones genéticas como el síndrome de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos.
- No dejar de tomar el antibiótico sin hablar primero con su profesional de la salud.

Arcsa invita a la comunidad informar sobre cualquier sospecha de eventos adversos asociados a productos de uso y consumo humano, a través del correo de farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.ec