



Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y complicaciones infecciosas graves

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria Arcsa, a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia da a conocer a los profesionales de la salud, establecimientos del Sistema Nacional de Salud y al público en general la comunicación de seguridad de la agencia reguladora de medicamentos de Francia (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé - ANSM), referente al uso de productos farmacéuticos que contienen ibuprofeno y ketoprofeno, los cuales son empleados por sus propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas.

Al respecto, la agencia reguladora de medicamentos de Francia (ANSM) emitió un comunicado, como resultado de un estudio realizado por sus centros regionales de farmacovigilancia en Tours y Marsella, en el cual pone conocimiento los reportes de complicaciones infecciosas graves asociados al uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), tales como ibuprofeno (y probablemente del ketoprofeno) empleado para la fiebre o el dolor, promoviendo probablemente el crecimiento bacteriano y disminuyendo la efectividad de la terapia con antibióticos.

Estas complicaciones graves se pueden presentar en ciertas infecciones bacterianas a nivel cutáneo o pulmonar si el organismo causante es *Streptococcus pyogenes* o un neumococo.

En este sentido, el Centro Nacional de Farmacovigilancia de la Arcsa, realiza las siguientes recomendaciones:

A los Profesionales de la Salud:

- Considerar el uso de paracetamol en caso de dolor y/o fiebre, en particular en el contexto de infecciones comunes como amigdalitis, rinofaringitis, otitis media, tos, infección pulmonar, lesión de la piel o varicela.
- Prescribir y usar AINEs a la dosis efectiva más baja y por el tiempo más corto.
- Detener el tratamiento tan pronto como desaparezcan los síntomas.
- Evitar el uso de los AINEs señalados, en caso de varicela.
- No prolongar el tratamiento por más de 3 días en caso de fiebre.



- No prolongar el tratamiento por más de 5 días en caso de dolor.

A los Pacientes:

- No tome dos medicamentos AINEs al mismo tiempo.
- Antes de iniciar un tratamiento que incluya un AINE, consultar a su profesional de la salud sobre los beneficios y los posibles riesgos de su uso. No se automedique.

Arcsa invita a la comunidad a informar sobre cualquier sospecha de eventos adversos asociados a productos de uso y consumo humano, a través del correo de farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.ec

Para más información sobre acerca del comunicado de seguridad visite en el sitio web de la ANSM:

<https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Anti-inflammatoires-non-steroidiens-AINS-et-complications-infectieuses-graves-Point-d-Information>